

Nøkur nýggj taranøvn (2002)

Jóhan Hendrik W. Poulsen og Marjun A. Simonsen

Andgreindur hártari	(<i>Desmarestia viridis</i>)	da. Modsatgrenet kællingehår
Bendilsleipa	(<i>Dumontia contorta</i>)	no. Bendelsleipe
Brimskúvur	(<i>Acrosiphonia arcta</i>)	da. Kroggrenet filtbusk
Brúnslýggj	(<i>Ectocarpus siliculosus</i>)	da. Brunslim
Eintáttaður klótari	(<i>Ceramium secundatum</i>)	da. ”Ensidig” klótari
Fínur liðatari	(<i>Polysiphonia stricta</i>)	”Fin” liðatari
Fjøruslógv	(<i>Scytosiphon lomentaria</i>)	da. Pølsetang
Greindur slýleggur	(<i>Enteromorpha compressa</i>)	”Grenet” slýleggur
Langvaksin liðatari	(<i>Polysiphonia elongata</i>)	”Langstrakt” liðatari
Liðað rósúrør	(<i>Lomentaria articulata</i>)	da. Leddelt rosenrør
Rísinsnót	(<i>Aglaothamnion sepositum</i>)	da. Busket havpryd
Skúvliðatari	(<i>Polysiphonia brodiaei</i>)	”Pensel” liðatari
Tindutur klótari	(<i>Ceramium shuttleworthianum</i>)	”Pigget” klótari
Vanligur klótari	(<i>Ceramium rubrum</i>)	”Almindelig” klótari
Vanligt rósúrør	(<i>Lomentaria clavellosa</i>)	da. Almindelig rosenrør
Vanligur hártari	(<i>Desmarestia aculeata</i>)	da. Almindelig kællingehår

Nøvnini vórðu evnað til í sambandi við greinina “Eitt sindur um stórtara í Føroyum“ eftir Ruth Nielsen.
Frøði 2/2002